

Tumeurs épithéliales (Evaluations)

Date de création du document 2010_2011

QCM

QUESTION 1/8 :

Les tumeurs neuroendocrines sont des tumeurs :

A - Mucosécrétantes

B - Toujours bénignes

C - Uniquement localisées au niveau du poumon

D - Caractérisées par la présence dans les cellules tumorales de grains neurosécrétoires intracytoplasmiques

E - Parfois multiples

(Réponse : DE)

QUESTION 2/8 :

Le carcinome basocellulaire est une tumeur :

A - Bénigne

B - Mésenchymateuse

C - Donnant des métastases précoces

D - Localisée à la peau

E - Maligne

(Réponse : DE)

QUESTION 3/8 :

Le papillome est une tumeur :

A - Épithéliale

B - Mésenchymateuse

C - Souvent due à une infection par un virus du groupe HPV (Human papilloma virus)

D - Souvent due à une infection par le virus d'Epstein-Barr

E - Due à une mycose à Candida

(Réponse : AC)

QUESTION 4/8 :

Parmi les propositions suivantes concernant un carcinome épidermoïde différencié, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A - C'est une tumeur épithéliale**
- B - C'est une tumeur maligne**
- C - Il rappelle par son architecture un épithélium malpighien**
- D - Il peut comporter de la kératine**
- E - Il peut être observé au niveau de l'œsophage**

(Réponse : ABCDE)

QUESTION 5/8 :

Parmi les organes suivants, pour lequel (lesquels) les carcinomes épidermoïdes sont-ils les tumeurs malignes primitives les plus fréquentes ?

- A - Larynx**
- B - Col utérin**
- C - Œsophage**
- D - Anus**
- E - Pancréas**

(Réponse : ABCD)

QUESTION 6/8 :

Un adénome est :

- A - Une lésion non tumorale**
- B - Une tumeur bénigne**
- C - Une tumeur maligne**
- D - Une prolifération reproduisant un épithélium glandulaire**
- E - Synonyme de polype**

(Réponse : BD)

QUESTION 7/8 :

Une tumeur épithéliale :

- A - Peut être bénigne ou maligne**
- B - Est un sarcome quand elle est maligne**
- C - Est un adénome quand elle est bénigne et à différenciation glandulaire**
- D - Est un papillome quand elle est bénigne et à différenciation malpighienne**
- E - Peut être d'origine virale**

(Réponse : ACDE)

QUESTION 8/8 :

Les néoplasies malignes du sein :

- A - Sont aussi fréquentes que celles de l'ovaire**
- B - Sont le plus souvent des carcinomes épidermoïdes**
- C - Sont le plus souvent des sarcomes**
- D - Sont formellement diagnostiquées à la mammographie lorsqu'existent des microcalcifications**
- E - Peuvent être unies ou multifocales, ce qui conditionne un traitement chirurgical conservateur ou non**

(Réponse : E)