

Tumeurs non épithéliales (Evaluations)

Date de création du document 2010_2011

QCM

QUESTION 1/8 :

Le mélanome :

- A - Est une tumeur épithéliale**
- B - Est une tumeur bénigne**
- C - A un pronostic dépendant de son extension en profondeur (indice de Breslow)**
- D - Est une prolifération de cellules à différenciation mélanocytaire**
- E - Peut avoir une phase intra-épithéliale**

(Réponse : CDE)

QUESTION 2/8 :

Sur quel(s) critère(s) est basé le grade histopronostique des sarcomes ?

- A - La différenciation glandulaire**
- B - Le degré de différenciation tumorale**
- C - Le nombre de mitoses par champ au fort grossissement**
- D - La proportion de tissu tumoral nécrosé**
- E - Le nombre de métastases**

(Réponse : BCD)

QUESTION 3/8 :

Les tumeurs germinales :

- A - Sont dérivées des cellules germinales primordiales et de leur migration dans l'organisme**
- B - Peuvent se développer dans le médiastin**
- C - Peuvent contenir un contingent à différenciation trophoblastique (choriocarcinome)**
- D - Peuvent contenir un contingent à différenciation vitelline (tumeur vitelline)**
- E - Peuvent se manifester par la sécrétion dans le sang de substances comme la α -HCG**

(Réponse : ABCDE)

QUESTION 4/8 :

Parmi les propositions suivantes concernant les lymphomes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A - Ce sont des tumeurs bénignes développées à partir des cellules lymphoïdes**
- B - Certains virus sont impliqués dans la pathogénie de certains lymphomes**
- C - Les lymphomes T sont les plus fréquents**
- D - Ils sont tous non hodgkiniens**
- E - Ils peuvent être de siège ganglionnaire ou extra-ganglionnaire**

(Réponse : BE)

QUESTION 5/8 :

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A - Le léiomyome est une prolifération de fibres musculaires lisses**
- B - Le léiomyome est la tumeur conjonctive bénigne la plus fréquente de l'utérus**
- C - Les léiomyomes peuvent être multiples**
- D - Le léiomyosarcome est une tumeur conjonctive maligne constituée de tissu musculaire lisse**
- E - Le léiomyosarcome complique habituellement un léiomyome**

(Réponse : ABCD)

QUESTION 6/8 :

Le lymphome hodgkinien ou maladie de Hodgkin classique :

- A - Est un lymphome dérivé de lymphocytes B**
- B - Est de siège toujours ganglionnaire**
- C - Renferme peu de cellules tumorales et de nombreuses cellules inflammatoires**
- D - Comporte plusieurs types histologiques**
- E - Guérit souvent après un traitement adapté**

(Réponse : ACDE)

QUESTION 7/8 :

Le leiomyosarcome utérin :

- A - Est 100 fois plus fréquent que le leiomyome utérin**
- B - Est bien limité**
- C - Est fait de cellules tumorales ayant des anomalies cytonucléaires marquées**
- D - Reproduit du muscle strié**
- E - Est à l'origine de métastases se faisant surtout par voie lymphatique**

(Réponse : C)

QUESTION 8/8 :

Quel est le principal facteur pronostique des mélanomes ?

- A - Le grand diamètre de la tumeur**
- B - L'épaisseur maximale de la tumeur mesurée cliniquement**
- C - L'épaisseur maximale de la tumeur, mesurée histologiquement**
- D - Le type histologique du mélanome**
- E - La localisation de la tumeur**

(Réponse : C)