

# Les états dépressifs du sujet âgé (Evaluations)

---

**Date de création du document**    2008-2009

## QCM

### QUESTION 1/6 :

La prévalence d'un épisode dépressif majeur est de l'ordre de :

- A - 3% au delà de 65 ans.
- B - 5% au delà de 65 ans.
- C - 1% au delà de 65 ans.
- D - 6% au delà de 65 ans
- E - 10% au-delà de 65 ans.

*(Réponse : A )*

### QUESTION 2/6 :

Les états dépressifs sont associés à des signes repérés chez le sujet âgé comme la douleur morale, la tristesse, le ralentissement et d'autres. Particulièrement la douleur morale :

- A - est liée à l'expression de sentiments traduisant les efforts consentis afin d'accepter le processus du vieillissement.
- B - fait partie des réactions normales à une perte.
- C - correspond à l'inquiétude provoquée par des difficultés existentielles et a comme résultat l'envahissement total de la vie psychique du sujet âgé.
- D - reflète une impression de vivacité atténuée, renvoie à une réduction de fluidité verbale, des capacités langagières et d'associations d'idées.

*(Réponse : A )*

### QUESTION 3/6 :

Choisissez l'énoncé où est décrite la notion des troubles caractériels, le sujet âgé présente :

- A - une réduction de fluidité verbale.
- B - une anorexie, une asthénie, des plaintes somatiques.
- C - des difficultés d'adaptation ou des réactions incompréhensibles pour son entourage.
- D - des symptômes anxieux ou dans le sens inverse, une attitude d'apraxie en restant confinée dans son lit.

*(Réponse : C )*

**QUESTION 4/6 :**

L'origine des dépressions secondaires à des affections somatiques est liée à :

- A - des symptômes comme la dévalorisation, le pessimisme, l'anhédonie et les idées suicidaires.**
- B - la présence d'asthénie, de diminution de l'intérêt et de troubles du sommeil.**
- C - l'usage des traitements médicamenteux et plus précisément des anticholinestérasiques.**
- D - la prescription des antihypertenseurs centraux ou des neuroleptiques.**
- E - un raptus anxieux ou une évolution incontrôlable du trouble dépressif associé à un vécu délirant.**

*(Réponse : D )*

**QUESTION 5/6 :**

Le risque évolutif majeur est défini comme :

- A - l'intensité d'un éventuel vécu délirant.**
- B - l'aspect d'une dépression intense avec prostration ou mutisme, ou au contraire agitation et agressivité.**
- C - le passage à l'acte suicidaire.**
- D - une modification comportementale régi par l'agitation, les cris, l'appel de membre de famille.**

*(Réponse : C )*

**QUESTION 6/6 :**

Parmi les différentes thérapeutiques, choisissez celle qui est indiquée dans les formes mélancoliques et/ou dans le cas de patients éprouvant des manques alimentaires marquées :

- A - la prescription d'un sérotoninergique.**
- B - la prescription des anticholinergiques.**
- C - la psychothérapie associée au traitement chimique.**
- D - la mise en place d'aides à domicile, l'incitation à une participation sociale familiale ou de voisinage**
- E - la sismothérapie.**

*(Réponse : E )*