

Syndrome d'immobilisation (Evaluations)

Date de création du document 2008-2009

QCM

QUESTION 1/5 :

L'anorexie constitue un des symptômes les plus importants chez le sujet âgé hospitalisé et immobilisé. Les facteurs qui jouent pour qu'elle apparaisse sont :

- A - l'augmentation de la viscosité sanguine, la déshydratation et une néoplasie abdominale ou pelvienne.
- B - la sécrétion des cytokines qui agissent directement sur les aires concernées du système nerveux central.
- C - les troubles de déglutition et les embolies pulmonaires de symptomatologie atypique.
- D - un syndrome dépressif, une gastrite ou un ulcère gastroduodéal indolore.
- E - un syndrome inflammatoire accompagnant toutes les maladies infectieuses ou ischémiques.

(Réponse : CDE)

QUESTION 2/5 :

Les signes de manifestation du fécalome chez le sujet âgé sont :

- A - l'hydratation insuffisante et l'immobilité des muscles abdominaux diminuant le péristaltisme abdominale.
- B - les thromboses veineuses pelviennes, l'incontinence urinaire et la subocclusion et l'occlusion intestinale.
- C - l'existence d'un syndrome inflammatoire qui accompagne toutes les pathologies infectieuses ou ischémiques.
- D - les fausses diarrhées, une rétention d'urines aiguë ou chronique et le diagnostic d'un syndrome confusionnel.
- E - un facteur iatrogène extérieur médicamenteux et la constipation.

(Réponse : BD)

QUESTION 3/5 :

Quel est facteur qui fait aggraver les rétentions urinaires ?

- A - une pathologie due à la constipation, à un fécalome ou un adénome prostatique préexistant.**
- B - une infection urinaire parenchymateuse provoquée par la stase vésicale et la déficience du dispositif antireflux vésico-urétéral.**
- C - les traitements diurétiques anticholinergiques.**
- D - un pyélonéphrite.**
- E - l'augmentation du globe vésical de 500 cc et la distension de la paroi vésicale.**

(Réponse : C)

QUESTION 4/5 :

On entend par « escarre » :

- A - la diminution du tonus musculaire des membres inférieurs entraînant une stase veineuse lors du passage en orthostatisme.**
- B - la diminution des mouvements pulmonaires favorisant la stase des sécrétions bronchiques.**
- C - une zone de nécrose cutanée et sous-cutanée se produisant aux points de pression.**
- D - une désadaptation des réflexes neurovasculaires.**
- E - une diminution de sensibilité des barorécepteurs.**

(Réponse : C)

QUESTION 5/5 :

Mettez en ordre les différents stades des escarres, fondés sur la classification européenne :

- A - lésion cutanée partielle > lésion cutanée intéressant l'épiderme, le derme ou les deux.**
- B - érythème sans blanchissement à la pression, sans effraction cutanée > lésion cutanée partielle intéressant toutes les couches de la peau.**
- C - érythème > lésion cutanée partielle > lésion cutanée intéressant toutes les couches dermiques > destruction extensive des tissus**
- D - érythème sans effraction cutanée > souffrance tissulaire au niveau du muscle de l'os ou des structures sous-jacentes, avec ou sans perte de substance cutanée complète.**

(Réponse : C)

