

La surveillance clinique et paraclinique du post-partum immédiat (Evaluations)

Comité éditorial pédagogique de l'UVMaF

Date de création du document 01/03/11

QCM

QUESTION 1/4 :

L'hémorragie de la délivrance correspond au risque majeur des suites de couches immédiates.

A - Oui.

B - Non.

(Réponse : A)

QUESTION 2/4 :

La fréquence de la surveillance de l'accouchée pendant le post-partum immédiat doit être :

A - régulière toutes les 30 mn.

B - adaptée au contexte.

C - continue avec une patiente monitorée pour la prise de ses constantes.

(Réponse : B)

QUESTION 3/4 :

Les paresthésies des membres inférieurs de l'accouchée sont uniquement en rapport avec une analgésie locorégionale.

A - Oui.

B - Non.

(Réponse : B)

QUESTION 4/4 :

L'hyperthermie modérée des suites de couches immédiates est un diagnostic d'exclusion.

A - Oui.

B - Non.

(Réponse : A)

QROC

QUESTION 1/2 :

La surveillance clinique et paraclinique des suites de couches immédiates doit être transcrite sur le dossier médical. Citer les éléments de surveillance de l'examen obstétrical.

Réponse attendue :

- L'involution, la consistance et la sensibilité utérine ;
- la quantité et la nature des saignements ;
- l'examen du périnée ;
- la miction.

QUESTION 2/2 :

Devant quels éléments peut-on suspecter la formation d'un hématome voire d'un thrombus ?

Réponse attendue :

Il est suspecté devant une douleur périnéale pulsatile, voire d'une sensation de poussée. À l'examen vulvo-vaginal apparaît une masse cutanée, plus ou moins violacée, mobilisable dont la souplesse laisse présager une collection sanglante en formation.