

La mort inattendue du nourrisson (MIN) (Evaluations)

Comité éditorial pédagogique de l'UVMaF

Date de création du document 2011-1012

QCM

QUESTION 1/5 :

La MSN se définit par le décès brutal et inattendu d'un enfant de :

- A - moins de 8 jours
- B - moins de 6 mois
- C - moins de 1 an
- D - moins de 2 ans

(Réponse : C)

QUESTION 2/5 :

Compte-tenu des facteurs de risque, quels sont les conseils de prévention que vous pouvez donner aux parents d'un nouveau-né ?

- A - couchage en DD
- B - pas d'utilisation de couettes, couverture...
- C - pas de température excessive dans la chambre (19°) et surveillance de la température de l'enfant en cas d'infection
- D - éviter le co-sleeping
- E - favoriser le partage de la chambre avec les parents les 6 1ers mois
- F - éviter le tabagisme passif
- G - favoriser les vaccinations

(Réponse : ABCDEFG)

QUESTION 3/5 :

Quelles sont les pathologies susceptibles de favoriser la MIN ?

- A - hyperthermie
- B - certains troubles du rythme cardiaque
- C - maladies métaboliques de l'oxydation des acides gras

D - apnées obstructives par malformations des voies aériennes ou lors de problèmes infectieux

E - apnée centrale par immaturité du système nerveux

(Réponse : ABCDE)

QUESTION 4/5 :

Que comporte le bilan étiologique et diagnostic ?

A - examen macroscopique

B - autopsie

C - examen radiologique et imagerie

D - synthèse du dossier médical grâce à un staff pluridisciplinaire

(Réponse : ABCD)

QUESTION 5/5 :

La prise en charge d'un nourrisson avec antécédent de MIN dans la fratrie comporte :

A - une hospitalisation systématique

B - une surveillance par scope non systématique à visée anxiolytique

C - une surveillance par scope entre 2 mois et 8 mois

D - l'arrêt de la surveillance par scope après 2 mois sans déclenchement de l'

(Réponse : B)

QROC

QUESTION 1/1 :

A quel âge se situe le pic maximum de survenue des décès de MIN ?

Réponse attendue :

2 à 3 mois