

Confusion et démences (Evaluations)

Date de création du document 2008-2009

QCM

QUESTION 1/4 :

On entend par « syndrome démentiel » :

- A - l'état d'altération progressive et irréversible des fonctions cognitives.
- B - la sidération des automatismes acquis entraînant une perte des réactions d'adaptation posturale, avec difficulté à se maintenir en orthostatisme.
- C - ou delirium, l'état de faillite temporaire et réversible du fonctionnement
- D - l'impossibilité d'obtenir la ration protéino-énergétique nécessaire à cause de la sévérité de la maladie et l'intensité de l'anorexie.

(Réponse : A)

QUESTION 2/4 :

L'apparition de déficits cognitifs multiples et plus précisément des perturbations cognitives constituent des critères de définition de la maladie d'Alzheimer. Parmi les perturbations possibles, l'agnosie correspond à :

- A - des troubles langagiers.
- B - une altération de la capacité à réaliser une activité malgré des fonctions motrices intactes.
- C - la difficulté de reconnaître des objets en dépit des fonctions sensorielles intactes.
- D - des troubles liés à des fonctions exécutives concernant l'organisation dans le temps, la mise en place des projets, la capacité d'avoir des pensées abstraites.
- E - une affection psychiatrique issue d'une dépression majeure ou même encore de la schizophrénie.

(Réponse : C)

QUESTION 3/4 :

Afin de faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, il faut être amené à de différents types d'examens aptes à valider les signes y relatifs. A part les tests d'évaluations cognitifs et les examens biologiques, le médecin peut recourir à des examens médicaux comme la tomoscintigraphie d'émission monophotonique qui permet :

- A - d'éliminer des causes de démence « curable ».**
- B - de repérer une atrophie hippocampique.**
- C - de vérifier s'il y a un hypodébit sanguin cérébral.**
- D - de mesurer le métabolisme cérébral de façon absolue.**

(Réponse : C)

QUESTION 4/4 :

Une prise en charge médicamenteuse chez le sujet âgé, peut inclure deux formes de lutte contre ses troubles cognitifs et/ou comportementaux. Ayant comme objectif de traiter de façon optimale les troubles du comportement, il faut :

- A - fournir au patient des anticholinestérases pour augmenter le taux d'acétylcholine en déficit.**
- B - prescrire de la tacrine, du donépézil et de la rivastigmine en fonction de la forme de maladie : légère, modérée, modérément légère.**
- C - mettre en place une politique préventive en prescrivant des inhibiteurs calciques, des œstrogènes, des anti-inflammatoires non stéroïdiens.**
- D - prescrire des psychotropes sous la condition qu'une série de critères comme la mise en place d'une monothérapie, la durée de vie courte et l'essai d'arrêt après avoir effectué un traitement de quelques jours soit respectée.**

(Réponse : D)