

La personne âgée malade (Evaluations)

Date de création du document 2008-2009

QCM

QUESTION 1/4 :

En Gériatrie, quand on aborde le sujet de syndrome de fragilité, on entend :

- A - la survenue des maladies chroniques sur un terrain plus ou moins fragilisé par le vieillissement.
- B - la survenue des maladies aiguës sur un terrain plus fragilisé par le vieillissement.
- C - le risque permanent de décompensation fonctionnelle pouvant amener à une détérioration de l'état de santé et par conséquent à la dépendance.
- D - la prescription d'une surmédicalisation qui pourrait compenser les différents types de déficits chez le sujet âgé.
- E - une affection aiguë qui déclenche des troubles organiques en série à cause d'un déséquilibre physiologique de l'organisme.

(Réponse : C)

QUESTION 2/4 :

Le syndrome confusionnel, chez le sujet âgé est favorisé par :

- A - le déficit de réserve fonctionnelle rénale.
- B - des troubles cardio-vasculaires.
- C - le stress environnemental.
- D - des troubles métaboliques.
- E - les effets du vieillissement sur le cerveau.

(Réponse : E)

QUESTION 3/4 :

En vue de dépister l'état de fragilité chez le sujet âgé, on doit se fonder sur les paramètres suivants :

- A - l'état nutritionnel et la capacité aérobie
- B - la fonction musculaire et la capacité aérobie.

C - les fonctions cognitives et les capacités psychomotrices

D - la fonction musculaire, les aptitudes psychomotrices et l'état nutritionnel.

E - les fonctions cognitives, les aptitudes posturales, la fonction musculaire, l'état nutritionnel et la capacité aérobie.

(Réponse : E)

QUESTION 4/4 :

Les particularités clinique, c'est-à-dire les différents symptômes et la polypathologie associée sont caractérisés pour leur côté atypique. Plus précisément chez le malade âgé, on constate que l'exploration des signes biologiques est fondée sur :

A - une interprétation des symptômes, compliquée par la survenue d'une douleur aiguë et la confusion mentale ou la majoration des troubles cognitifs.

B - la différenciation des symptômes biologiques comme l'absence d'hyperleucocytose et la créatininémie normale chez les sujets très âgés.

C - la confusion, seule manifestation clinique d'une rétention urinaire ou d'un fécalome et la variation de la fièvre en cas d'infections.

D - l'examen des douleurs abdominales chez un sujet âgé souffrant de constipation chronique et l'asthénie et l'anorexie.

(Réponse : B)