

Item 183 : Accueil d'un sujet victime de violences sexuelles (Évaluations)

Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)

Date de création du document 2010-2011

QCM

QUESTION 1/2 :

Quels examens de contrôles sérologiques doivent être réalisés et avec quel délai ?

A - À 1 mois : PCR VIH 1, Sérologie VIH.

B - 1 mois : TPHA et VDRL.

C - À 3 mois : Chlamydiae, HIV.

D - À 3 mois : Hépatites B et C.

(Réponse : ACD)

QUESTION 2/2 :

Quelles modalités proposez-vous pour prévenir la survenue d'une grossesse en fonction du délai ?

A - Prescription de Tétragynon* dans les 72 heures à renouveler 12 heures plus tard.

B - Prescription de Norlevo* dans les 48 heures à renouveler 12 heures plus tard.

C - Mise en place d'un DIU dans les 7 jours.

D - Toilette vaginale avec des spermicides dans les 12 heures.

(Réponse : ABC)

CAS CLINIQUE : PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D'ABUS SEXUEL

Scénario :

Une jeune femme de 20 ans consulte en urgence à la suite d'une agression sexuelle. Vous êtes le médecin de garde.

QUESTION 1/5 :

Quelles sont les différences entre une consultation après réquisition de la police et une consultation à la demande de la victime ?

Réponse attendue :

- accompagnement par policier,

- réquisitions pour la consultation et les examens,
- responsabilité du circuit des prélèvements assuré par la police,
- prise en charge par la police des frais,
- valeur juridique plus importante.

QUESTION 2/5 :

Au cours de la consultation, vous devez pratiquer des prélèvements locaux. Pour quelle recherche ?

Réponse attendue :

- SPZ, gonocoque, chlamydiae, mycoplasme,
- Sites :
- pour les germes : col, vagin, urètre, anus, gorge,
- pour le SPZ : en plus, vêtements éventuellement.

QUESTION 3/5 :

Des sérologies sont recommandées. Lesquelles ?

Réponse attendue :

- Chlamydiae,
- TPHA et VDRL,
- Hépatites B et C,
- HIV 1 et 2,
- Éventuellement HTLV .

QUESTION 4/5 :

Quelle attitude avez-vous vis-à-vis du risque de grossesse ?

Réponse attendue :

- Dosage des β -hCG,
- Prescription de la pilule du lendemain : Tétragynon* ou Norlevo*.

QUESTION 5/5 :

Quels traitements sont envisagés ?

Réponse attendue :

- Prescription d'un éventuel arrêt de travail,
- Prescription de la pilule du lendemain : Tétragynon* ou Norlevo*,
- Antibiothérapie présomptive Doxycycline 2 cp/j pendant 8 jours,
- *Proposition de la thérapie antirétrovirale <=> Contacter le médecin du CISIH.*