

Item 164 : Lymphomes malins (Evaluations)

Date de création du document 2009-2010

QCM

QUESTION 1/4 :

Le risque évolutif le plus fréquent de la leucémie lymphoïde chronique est :

- A - la transformation en leucémie aiguë**
- B - les infections bactériennes**
- C - l'apparition d'une méningite leucémique**
- D - les compressions par des adénopathies profondes**
- E - les thromboses vasculaires**

(Réponse : B)

QUESTION 2/4 :

Indiquez les complications hématologiques pouvant survenir en cours d'évolution d'une leucémie lymphoïde chronique :

- A - Purpura thrombopénique auto-immun**
- B - Anémie hémolytique auto-immune**
- C - Transformation en leucémie aiguë lymphoblastique**
- D - Apparition d'un Lymphome Non-Hodgkinien (LNH) à grandes cellules**
- E - Apparition d'une maladie de Hodgkin**

(Réponse : ABD)

QUESTION 3/4 :

Indiquez la proposition inexacte parmi les suivantes concernant la leucémie lymphoïde chronique :

- A - Elle consiste habituellement en une prolifération polyclonale B**
- B - Il s'agit de la plus fréquente des leucémies**
- C - Elle est parfois associée à anémie ou une thrombopénie auto-immune**

D - Elle est parfois associée à une hypogammaglobulinémie

E - Elle est parfois associée à une immunoglobulinémie monoclonale IgM

(Réponse : A)

QUESTION 4/4 :

Au cours d'une LLC habituelle l'hyperlymphocytose sanguine est constituée majoritairement :

A - de lymphocytes morphologiquement normaux

B - de lymphocytes villeux

C - de prolymphocytes

D - de lymphoblastes

E - de lymphocytes hyperbasophiles

(Réponse : A)