

Item 345 : Vomissements de l'adulte (avec le traitement)

Date de création du document 2008-2009

Table des matières

1 Définitions et diagnostic.....	1
2 Physiopathologie.....	2
3 Complications et conséquences des vomissements.....	3
4 Démarche diagnostique.....	4
4 . 1 Explorations complémentaires.....	1
4 . 2 Vomissements aigus.....	1
4 . 3 Vomissements chroniques.....	1
4 . 4 Vomissements de la grossesse.....	1
4 . 5 Vomissements induits par la chimiothérapie.....	1
5 Traitement.....	5

OBJECTIFS

ENC :

- Devant des vomissements du nourrisson, de l'enfant ou de l'adulte, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi de l'évolution.

I DÉFINITIONS ET DIAGNOSTIC

A. Définitions

Nausées : sensation subjective désagréable non douloureuse provenant du tractus digestif haut, associée au besoin de vomir ou à la sensation que les vomissements sont imminents.

Vomissements : mécanisme actif de contractions cycliques violentes de la musculature abdominale, du diaphragme et des muscles respiratoires conduisant au rejet brutal par la bouche du contenu de l'estomac. Les vomissements peuvent être provoqués ou spontanés. Ils sont souvent précédés de haut-le-cœur : contractions synchrones du diaphragme, des muscles abdominaux et des muscles intercostaux externes, contre-glotte fermée.

Nausées et vomissements s'accompagnent de signes d'activation des systèmes sympathique et parasympathique : tachycardie ou bradycardie, sueurs froides, vasoconstriction cutanée avec pâleur, mydriase, hypersalivation, défécation.

B. Diagnostics différentiels

Régurgitations : remontée passive du contenu gastrique ou œsophagien dans la bouche, sans effort de vomissement ni nausée.

Mérycisme ou rumination : remontée volontaire dans la bouche d'aliments récemment ingérés qui sont ensuite de nouveau déglutis après mastication.

II PHYSIOPATHOLOGIE

Les éléments importants de la coordination des mécanismes conduisant aux vomissements sont :

- le centre du vomissement, situé dans la substance réticulée du tronc cérébral ;

- les stimulations nerveuses afférentes vers le centre du vomissement provenant :
 - de la zone chémoréceptrice située dans le plancher du 4^e ventricule (**area postrema**), sensible aux stimuli chimiques,
 - du cortex cérébral (ex : pensée, odeurs, émotions),
 - de l'appareil vestibulaire (ex : mal des transports, syndrome de Ménière),
 - des nerfs vague et sympathique provenant du tube digestif, du pharynx ;

- les efférences motrices conduisant aux vomissements eux-mêmes.

III COMPLICATIONS ET CONSÉQUENCES DES VOMISSEMENTS

Elles doivent être cherchées systématiquement à l'interrogatoire et à l'examen clinique, et confirmées si nécessaire par des explorations spécifiques :

- troubles hydro-électrolytiques (insuffisance rénale, hypokaliémie, hypochlorémie, alcalose métabolique) et déshydratation : pronostic vital parfois mis en jeu, notamment chez les sujets âgés et les nourrissons, en cas de diarrhée associée, en cas de troubles de la conscience ou en cas d'impossibilité complète d'absorber des liquides ;

- déchirure longitudinale du cardia liée aux efforts de vomissements (syndrome de Mallory-Weiss) : symptomatologie typique dans la moitié des cas : survenue d'une hématomèse à la suite de vomissements répétés initialement non sanglants.

L'endoscopie digestive haute est nécessaire pour confirmer le diagnostic et, si besoin, faire l'hémostase ;

- rupture de l'œsophage (syndrome de Boerhaave) : exceptionnel, très grave, urgence chirurgicale ; violente douleur thoracique à la suite de vomissements avec dyspnée, emphysème sous-cutané, odynophagie. Le diagnostic est confirmé par la tomodensitométrie thoracique : pneumomédiastin, emphysème sous-cutané, épanchement pleural, fuite œsophagienne du produit de contraste hydrosoluble ;

- inhalation bronchique avec pneumopathie (syndrome de Mendelssohn), surtout en cas de troubles de la conscience ou de troubles neurologiques ; peut mettre en jeu le pronostic vital ;

- œsophagite ;

- hémorragie sous-conjonctivale (sans gravité) ;

- dénutrition en cas de vomissements chroniques ;

- interruption des traitements pris par voie orale (médicaments non pris ou évacués avec les vomissements).

IV DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

Les causes de vomissement sont très nombreuses et diverses. On distingue arbitrairement les vomissements aigus et les vomissements chroniques (plus de 7 jours) ; il existe un recouvrement des causes entre ces 2 catégories.

Que les vomissements soient aigus ou chroniques, le diagnostic de leur cause est évoqué sur le contexte, le mode évolutif, les signes associés, la nature et le moment de survenue par rapport aux repas et les données de l'anamnèse et de l'examen clinique. Souvent les vomissements ne sont qu'un signe associé, mineur par rapport aux autres symptômes, c'est le cas des urgences abdominales par exemple. Parfois les vomissements sont le symptôme prédominant et la démarche diagnostique peut être plus difficile s'il n'y a pas d'élément d'orientation.

Les différentes causes et les attitudes diagnostiques ne peuvent être détaillées compte tenu du nombre de causes de vomissements ; se reporter aux chapitres les concernant. Quelques situations évocatrices :

- vomissements matinaux à jeun de liquide un peu glaireux avec haut-le-cœur (pituites) : évocateurs d'un alcoolisme ou d'autres intoxications ou intolérances (médicaments, tabac) et de la grossesse (très fréquent) ;
- vomissements en jet matinaux sans nausée ni haut-le-cœur : évocateurs d'une hypertension intracrânienne (rare) ;
- vomissements post-prandiaux tardifs répétés d'aliments nauséabonds partiellement digérés : évocateurs d'une obstruction chronique gastroduodénale organique ou fonctionnelle (non rare) ;
- vomissements fécaloïdes évocateurs d'une obstruction basse (rare) ou d'une fistule gastro-colique (exceptionnel) ;
- vomissements per-prandiaux ou immédiatement après le repas : évocateurs d'une cause psychogène (très fréquents, mais diagnostic d'élimination) ;
- vomissements alimentaires plutôt en fin de journée en cas de syndrome obstructif (obstacle organique incomplet) précédés de l'apparition progressive de nausées, ballonnements, satiété et possibles crampes dans la journée).

Certains diagnostics doivent toujours être évoqués : grossesse, surdosage ou intolérance à certains médicaments (digitaline, théophylline, opiacés...) ou toxiques (**tableau 37.I**), causes métaboliques (dont l'insuffisance rénale aiguë et surrénalienne) et hypertension intracrânienne.

L'examen clinique (complet incluant l'examen neurologique) doit chercher des signes de complications (cf. physiopathologie), notamment des signes de déshydratation et, en cas de vomissements chroniques, des signes de dénutrition, et des éléments en faveur des causes énumérées après.

Tableau 37.I. Principaux médicaments et toxiques responsables de vomissements.

Antibiotiques (érythromycine, aminosides...)	Digitaliques +++
Antimitotiques +++	Lévodopa
Colchicine	Opiacés
Dérivés de l'ergot de seigle	Quinine
Dérivés de la théophylline ++	Salicylés
Alcool	Nicotine

IV.1 EXPLORATIONS COMPLÉMENTAIRES

En cas de signes cliniques de déshydratation, de perte de poids, d'altération de l'état général, de vomissements chroniques et systématiquement chez les sujets à risque (sujets âgés, diabète, insuffisance cardiaque ou rénale connue) : évaluation du retentissement biologique :

- ionogramme sanguin (alcalose métabolique avec hypochlorémie et hypokaliémie sont caractéristiques de troubles métaboliques induits par des vomissements), créatininémie, Numération de formule sanguine pour l'hématocrite, urée, créatinine sérique et ionogramme urinaire (à la recherche de signes d'insuffisance rénale fonctionnelle) ;
- recherche de signes biologiques de dénutrition en cas de vomissements chroniques : albuminémie, pré-albuminémie.

Les explorations complémentaires à la recherche de la cause ne sont pas systématiques ; c'est surtout quand il n'y a pas d'orientation diagnostique qu'elles sont nécessaires ou pour confirmer une cause évoquée sur l'anamnèse.

IV.2 VOMISSEMENTS AIGUS

Les causes les plus fréquentes de vomissements aigus sont indiquées dans le **tableau 37.II**.

Tableau 37.II. Causes les plus fréquentes de vomissements aigus.

Causes abdominales	
Médicales : - Gastro-entérite aiguë et toxi-infection alimentaire +++ - Hépatite aiguë - Sténose du pylore (ulcère) - Colique hépatique - Colique néphrétique	Chirurgicales : - Syndrome occlusif - Péritonite - Cholécystite aiguë - Pancréatite aiguë ou poussée de pancréatite chronique - Infarctus mésentérique - Torsion d'un kyste de l'ovaire - Grossesse extra-utérine
Causes médicamenteuses et toxiques	
Voir tableau 37.I	
Causes neurologiques	
Maladies vestibulaires (syndrome labyrinthique) Migraine	Méningite Hypertension intracrânienne Hémorragie méningée
Causes métaboliques et endocriniennes	
Acidocétose diabétique Insuffisance rénale aiguë Hypercalcémie	Insuffisance surrénale aiguë Hyponatrémie Hyperthyroïdie aiguë
Autres	
Grossesse +++ Post-opératoire Mal des transports Glaucome aigu	Infarctus du myocarde inférieur Radiothérapie Vomissements psychogènes

Les vomissements aigus sont le plus souvent dus à une gastro-entérite virale ou à une toxi-infection alimentaire (contexte évocateur surtout si plusieurs personnes dans l'entourage sont atteintes ou épidémie en cours).

Les vomissements sont au second plan dans les situations de douleurs abdominales aiguës.

L'orientation vers une cause neurologique repose sur les signes associés :

- syndromes vestibulo-labyrinthiques : vertiges ;
- migraine : céphalées, signes prodromiques et évolution par crises ;
- méningite : fièvre, photophobie et raideur méningée ;
- traumatisme crânien : la survenue de vomissements doit faire craindre une contusion cérébrale ou un hématome extra- ou sous-dural.

Les causes métaboliques et endocriniennes ne sont diagnostiquées que par les explorations biologiques spécifiques.

Les pièges, en dehors des causes médicamenteuses et de la grossesse, sont le glaucome aigu et l'infarctus du myocarde inférieur notamment en cas de douleurs abdominales hautes associées et l'insuffisance rénale aiguë.

(En savoir plus : (1) PIERRE S., CORNO G. Nausées et vomissements postopératoires de l'adulte. Postoperative nausea and vomiting in adult patients [en ligne]. Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation. Vol. 22, Issue 2, Février 2003, 119-129 p.) (1) Nausées et vomissements postopératoires de l'adulte.

(Recommandation : (1) Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada. Directive clinique sur la prise en charge des nausées et des vomissements postopératoires[en ligne]. Juillet 2008, Vol. 209.) (1) Directive clinique sur la prise en charge des nausées et des vomissements postopératoires.

IV.3 VOMISSEMENTS CHRONIQUES

Les causes de vomissements chroniques (> 7 jours) ou récidivants sont très nombreuses (**tableau 37.III**) ; les plus fréquentes sont les sténoses digestives et les causes psychologiques ou psychiatriques.

Tableau 37.III. Causes des vomissements chroniques.

Tractus digestif supérieur	
Obstruction mécanique : – Ulcère et cancer gastrique ou duodénal, cancer du pancréas envahissant le duodénum, compression par pseudo-kyste pancréatique	Obstruction fonctionnelle : – Gastroparésie : diabète, sclérodémie, amylose – Après chirurgie gastrique, vagotomie
Intestin et côlon	
Obstruction mécanique tumorale : – Adénocarcinome – Carcinose péritonéale Sténose mécanique non tumorale : – Maladie de Crohn – Post-radiothérapie – AINS – Adhérences, brides – Hernies – Volvulus – Invagination	Obstruction fonctionnelle : – Pseudo-obstruction intestinale chronique – Sclérodémie – Diabète – Amylose
Psychogène/psychiatrique	
Anorexie mentale, boulimie	Vomissements psychogènes
Système nerveux central	
Hypertension intracrânienne	Épilepsie
Médicaments et toxiques	
Voir tableau 37.I	
Grossesse	
Grossesse (1 ^{er} trimestre)	Hyperemesis gravidarum

Obstructions digestives hautes ou basses organiques : diagnostic habituellement facile. La cause de l'obstruction, suspectée sur le contexte, la symptomatologie et les données de l'examen clinique, est confirmée par les explorations complémentaires (endoscopie digestive haute ou basse, tomodensitométrie, entéroscanner ou Entéro-imagerie par résonance magnétique, transit du grêle ; la vidéo-capsule du grêle est contre-indiquée en cas d'obstruction digestive).

Hypertension intracrânienne : diagnostic difficile en cas de tumeur d'évolution lente ou d'hématome intracrânien : vomissements matinaux, discrètes modifications de l'état mental, troubles visuels, céphalées, vomissements sans nausée, vomissements déclenchés par les manœuvres augmentant la pression intra-crânienne, discrètes anomalies à l'examen neurologique (syndrome vestibulaire et/ou cérébelleux) sont des éléments d'orientation (Tomodensitométrie cérébral).

Causes métaboliques, endocrines et grossesse doivent être systématiquement envisagées et éliminées en l'absence d'autre orientation diagnostique : Bêta-hormone chorionique gonadotrope (test de grossesse), créatininémie, natrémie, glycémie, calcémie, cortisolémie, Thyroéostimuline hormone ou en anglais thyroid stimulating hormone.

Pseudo-obstruction intestinale chronique, exceptionnelle, de diagnostic difficile.

Causes psychogènes et psychiatriques : les vomissements de l'anorexie mentale et de la boulimie sont provoqués. Les vomissements psychogènes sans maladie psychiatrique sont très fréquents, souvent déclenchés par des épisodes d'anxiété, sans retentissement sur l'état général. Ils sont plus fréquents chez les femmes. Les vomissements per-prandiaux ou immédiatement post-prandiaux sont évocateurs (ils sont soit permanents soit d'évolution périodique ou capricieuse). C'est un diagnostic d'élimination.

IV.4 VOMISSEMENTS DE LA GROSSESSE

Au premier trimestre de la grossesse :

- les vomissements sont fréquents (jusqu'à 50 % des femmes) et considérés comme physiologiques s'ils n'entraînent pas de retentissement sur l'état général ; ils peuvent précéder la connaissance de la grossesse. Ils disparaissent d'eux-mêmes ;

- l'hyperemesis gravidarum (vomissements gravidiques) (3,5 pour 1 000 grossesses) est la forme la plus sévère des vomissements de la grossesse avec déshydratation, pertes ioniques et dénutrition. Il y a une cytolysse et/ou une cholestase parfois ictérique. La cause reste inconnue, bien qu'une origine psychogène soit suspectée. Toutes les anomalies disparaissent à l'arrêt des vomissements.

Au troisième trimestre de la grossesse :

- soit cause non liée à la grossesse ;
- soit cause spécifique : stéatose aiguë gravidique (0,01 % des grossesses), pré-éclampsie.

Ces deux situations sont des urgences thérapeutiques.

IV.5 VOMISSEMENTS INDUITS PAR LA CHIMIOTHÉRAPIE

On distingue 3 types de vomissements induits par la chimiothérapie :

- aigus (< 24 h après le début du traitement) ;
- retardés (> 24 h après le début du traitement) ;
- anticipés (avant administration).

Le potentiel émétisant des chimiothérapies dépend du produit et de la dose (le % indique la fréquence des vomissements) :

- risque émétique fort (> 90 %) : cisplatine, cyclophosphamide à forte dose ;
- risque moyen : (30-90 %) : oxaliplatine, carboplatine, cyclophosphamide à plus faible dose, adriamycine ;
- risque faible (10-30 %) : 5-fluorouracile, méthotrexate, taxanes, mitomycine ;
- risque minime (< 10 %) : bléomycine, bévacizumab, vinblastine, vincristine, gemcitabine.

Les facteurs qui augmentent le risque sont le mode d'administration (bolus plus émétisant qu'une perfusion continue), l'anxiété (surtout pour les vomissements anticipés), le sexe féminin, l'âge jeune et les vomissements lors de chimiothérapies antérieures (d'où l'importance de prévenir correctement les vomissements dès la première cure de chimiothérapie).

V TRAITEMENT

Le traitement est d'abord celui de la cause, si c'est possible. Les anti-émétiques ne sont indiqués que si les vomissements ne peuvent être supprimés par le traitement de leur cause. Certaines situations doivent conduire à une hospitalisation.

A. Indications à l'hospitalisation en urgence

Les situations qui doivent conduire à une hospitalisation en urgence sont :

- urgences médicales, obstétricales ou chirurgicales ;
- troubles hydro-électrolytiques (déshydratation) nécessitant une correction par voie parentérale ;
- troubles de la conscience (attention aux risques d'inhalation du contenu gastrique) ;
- impossibilité de réhydratation par voie orale ;
- impossibilité de prendre un traitement indispensable par voie orale (ex : anticoagulants) ;
- décompensation d'une affection associée ;
- complication des vomissements.

(Recommandation : (2) Agence française de sécurité sanitaire. Primperan et risque de syndrome extrapyramidal chez l'enfant [en ligne]. 16 Juillet 2007.) (2) Primperan et risque de syndrome extrapyramidal chez l'enfant.

B. Traitement symptomatique

Réhydratation per os ou IV et corrections d'éventuels troubles hydro-électrolytiques.

Pose d'une sonde gastrique d'aspiration s'il existe un risque d'inhalation, notamment en cas de troubles de la conscience ou si les vomissements sont abondants ou en cas d'urgence chirurgicale (occlusion) ; en cas de coma, une intubation trachéale peut être nécessaire pour protéger les bronches (en attendant l'intubation, mettre le malade en position latérale de sécurité).

Surveillance fondée sur les signes cliniques de déshydratation, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la diurèse et sur l'ionogramme sanguin avec créatininémie.

Médicaments à visée symptomatique antiémétique :

- **métoclopramine (Primperan)** : neuroleptique de la famille des benzamides. Stimule la motricité gastrique et effet central. A un effet anti-dopaminergique central et périphérique ; et cholinergique central et périphérique via l'activation d'un récepteur

Récepteur sérotoninergique ou en anglais 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 4. Bloque les récepteurs Antagoniste de la sérotonine à forte dose. Effets secondaires fréquents (10-20 %), notamment à forte dose et dans les traitements prolongés : effet sédatif, gynécomastie, galactorrhée, aménorrhée (augmentation de la prolactinémie), syndrome extrapyramidal avec dystonie et dyskinésies aiguës ou tardives.

Dose : 5-40 mg/j per os ou IV/im.

Contre-indications : antécédent de dyskinésie tardive liée aux neuroleptiques, phéochromocytome, consommation d'alcool, association à la lévodopa. En cas de vomissements en rapport avec une hépatopathie (notamment une hépatite grave), l'utilisation des antiémétiques neuroleptiques doit être proscrite ;

- **dompéridone (Motilium)** : neuroleptique de la famille des butyrophénones. Stimule la motricité gastrique. Passe peu la barrière hématoencéphalique. Effets secondaires centraux plus rares que le métoclopramide mais a les mêmes effets sur la sécrétion de prolactine.

Dose : 10-80 mg/j per os ou sublingual ;

- **métopimazine (Vogalène)** : classe des phénothiazines. Activité anti-dopaminergique élective en raison d'un très faible passage hémato-encéphalique.

Dose : 15-30 mg/j per os ou sublingual, 10-20 mg/j IV/im.

C. Traitement et prévention des vomissements induits par la chimiothérapie

La prévention dépend du risque émétique de la chimiothérapie et repose sur la combinaison des classes thérapeutiques suivantes :

- anti 5-HT₃ : granisétron, ondansétron, tropisétron, dolasétron (Kytril, Zophren...).
- Effets secondaires fréquents : céphalées, constipation, bouffées de chaleur, flushs ;
- aprépitant (Emend) : antagoniste sélectif à haute affinité pour les récepteurs de la substance P neurokinine 1 (Neurokinin 1). Effets secondaires fréquents : fatigue, constipation, augmentation des transaminases ;
- corticostéroïdes ;
- métoclopramide.

(En savoir plus : (2) SLIMANE K., PEREZ A. et al. Prise en charge des nausées et des vomissements chez les patients cancéreux [en ligne]. Bulletin du Cancer. Mai 2004, Vol. 91, Numéro 5, 403-408 p.) (2) Prise en charge des nausées et des vomissements chez les patients cancéreux.

(Recommandation : (3) Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada. Prise en charge des nausées et des vomissements durant la grossesse [en ligne]. Octobre 2002, Vol. 120.) (3) Prise en charge des nausées et des vomissements durant la grossesse.

VI ANNEXES

EN SAVOIR PLUS

- (1) PIERRE S., CORNO G. Nausées et vomissements postopératoires de l'adulte. Postoperative nausea and vomiting in adult patients [en ligne]. Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation. Vol. 22, Issue 2, Février 2003, 119-129 p. : <http://www.sciencedirect.com/science?ob=ArticleURL&udi=B6VKG-48C905H-8&user=592857&rdoc=1&fmt=&orig=search&sort=d&view=c&acct=C000030418&version=1&urlVersion=0&userid=592857&md5=4026bbc7fef716dbf50af1a3ce5e8591>
- (2) SLIMANE K., PEREZ A. et al. Prise en charge des nausées et des vomissements chez les patients cancéreux [en ligne]. Bulletin du Cancer. Mai 2004, Vol. 91, Numéro 5, 403-408 p. : <http://www.jle.com/fr/revues/medecine/bdc/e-docs/00/04/11/D8/article.md?type=text.html>

RECOMMANDATION

- (1) Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada. Directive clinique sur la prise en charge des nausées et des vomissements postopératoires[en ligne]. Juillet 2008, Vol. 209. : http://www.sogc.org/guidelines/index_f.asp
- (2) Agence française de sécurité sanitaire. Primperan et risque de syndrome extrapyramidal chez l'enfant [en ligne]. 16 Juillet 2007. : [http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Lettres-aux-professionnels-de-sante/Primperan-et-risque-de-syndrome-extrapyramidal-chez-l-enfant/\(language\)/fre-FR](http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Lettres-aux-professionnels-de-sante/Primperan-et-risque-de-syndrome-extrapyramidal-chez-l-enfant/(language)/fre-FR)
- (3) Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada. Prise en charge des nausées et des vomissements durant la grossesse [en ligne]. Octobre 2002, Vol. 120. : http://www.sogc.org/guidelines/index_f.asp

ABRÉVIATIONS

- 5-HT3 : Antagoniste de la sérotonine
- 5-HT4 : Récepteur sèrotoninergique ou en anglais 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 4
- bêta-HCG : Bêta-hormone chorionique gonadotrope
- entéro-IRM : Entéro-imagerie par résonance magnétique
- NFS : Numération de formule sanguine
- NK1 : Neurokinin 1
- TDM : Tomodensitométrie
- TSH : Thyréostimuline hormone ou en anglais thyroid stimulating hormone