

# Malformations foetales : Conduite à tenir à la naissance (Evaluations)

*Comité éditorial pédagogique de l'UVMaF*

**Date de création du document 2011-1012**

## QCM

### QUESTION 1/7 :

**L'atrésie de l'œsophage est associée classiquement pendant la grossesse à :**

- A - un hydramnios
- B - un oligoamnios
- C - un hydramnios et des malformations foetales associées
- D - un oligoamnios et des malformations foetales associées

*(Réponse : AC )*

### QUESTION 2/7 :

**En cas d'atrésie de l'œsophage avérée :**

- A - et si l'oesophage reste perméable avec une sonde 6 Fr, il est possible d'alimenter le nouveau-né
- B - il faut aspirer régulièrement les sécrétions oro pharyngées
- C - il est possible de ventiler l'enfant au masque en cas de détresse respiratoire
- D - la mortalité post opératoire est majeure

*(Réponse : B )*

### QUESTION 3/7 :

**En cas de malformation ano rectale avérée,**

- A - il est possible d'alimenter le nouveau-né si l'abdomen de l'enfant est souple à la palpation
- B - un des premiers objectifs est de veiller à l'élimination du méconium
- C - la présence de fistule périnéale distingue les formes hautes et basses de la pathologie
- D - il peut exister des malformations associées

*(Réponse : BD )*

**QUESTION 4/7 :**

**Concernant les fentes labio narinaires :**

- A - si elles sont isolées, la prise en charge est essentiellement esthétique
- B - si elles sont isolées, une demande du caryotype de l'enfant est néanmoins nécessaire
- C - il ne peut pas exister de fente palatine sans fente labio narinaire associée
- D - le caractère familial est exceptionnel

*(Réponse : A )*

**QUESTION 5/7 :**

**A propos des ambiguïtés sexuelles :**

- A - une hypertrophie clitoridienne isolée n'est pas une ambiguïté sexuelle
- B - l'hyperplasie congénitale des surrénales doit être traitée avant le sixième mois
- C - il est possible de déclarer le sexe de l'enfant à l'état civil en dehors des délais légaux
- D - le sexe d'élevage de l'enfant est fondé essentiellement sur des critères d'esthétique périnéal

*(Réponse : BC )*

**QUESTION 6/7 :**

**L'omphalocèle et le laparochisis sont :**

- A - des éviscérations couvertes ou non couvertes qui se distinguent par l'implantation du cordon abdominal.
- B - associés souvent à des malformations morphologiques et des aberrations chromosomiques
- C - des contre indications d'un accouchement voie basse sauf en maternité de niveau 3
- D - favorisent l'hypothermie à la naissance

*(Réponse : AD )*

**QUESTION 7/7 :**

**Une hernie diaphragmatique congénitale :**

- A - présente toujours un tableau clinique avec des bruits du coeur déviés à droite

B - contre indique une prise en charge d'une détresse respiratoire par intubation

C - nécessite un accouchement programmé en maternité de niveau 3

D - doit s'opérer en urgence et sans attendre à la naissance

*(Réponse : C)*