

Syndrome de Larva migrans (Evaluations)

Date de création du document 2008-2009

QCM

QUESTION 1/3 :

Cocher la ou les réponses bonnes :

- A - La toxocarose humaine peut être transmise par les chats.
- B - Le chiot n'émet jamais d'oeufs de *Toxocara canis* dans les fèces.
- C - Chez l'homme, les larves de *Toxocara canis*, n'évoluent jamais vers le stade adulte.
- D - La toxocarose est une zoonose cosmopolite.
- E - La prophylaxie de la toxocarose humaine nécessite de vermifuger les chiennes gravides.

(Réponse : ACDE)

QUESTION 2/3 :

Cocher la ou les réponses bonnes :

- A - L'hyperéosinophilie est rare au cours de la toxocarose.
- B - La toxocarose humaine est un syndrome de larva currens.
- C - Des complications oculaires peuvent survenir au cours de la toxocarose humaine.
- D - Le diagnostic biologique de la toxocarose humaine repose sur la recherche des oeufs dans les selles.
- E - La géophagie de l'enfant favorise la toxocarose.

(Réponse : CE)

QUESTION 3/3 :

La dermatite rampante ou larva migrans cutanée :

A - Est due à la pénétration transcutanée d'ankylostomes parasitant normalement des animaux.

B - Peut être due à des anguillules.

C - S'accompagne de lésion progressant de plusieurs centimètres chaque heure.

D - Peut être traitée par du thiabendazole (Mintezol®) per os ou localement.

E - Est observée dans toutes les régions chaudes et humides.

(Réponse : ADE)