

UE7 - Santé Société Humanité – Risques sanitaires

Chapitre 2 :

Epidémiologie descriptive

Exercices commentés

Docteur José LABARERE

Année universitaire 2010/2011

Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Exercice I

- Une étude a été conduite pour estimer le taux d'incidence de cancer parmi les salariés d'une entreprise.

N°	Age inclusion	Age dernières nouvelles	Statut dernières nouvelles
1	45	57,1	cancer
2	45	73	indemne
3	47	51,2	cancer
4	47	61,4	indemne
5	48	54,3	indemne
6	51	60	cancer
7	51	73	indemne
8	51	65,7	cancer
9	52	61,1	cancer
10	52	54,2	cancer
11	53	70,3	cancer
12	53	73	indemne
13	56	59,9	cancer
14	57	68,2	indemne
15	59	73	indemne
16	59	67,4	cancer

QCM 1

- *Dans cette entreprise, le taux d'incidence de cancer entre 55 et 65 ans :*
- **A est égal à la proportion de cas de cancer parmi les salariés de l'entreprise âgés de 55 à 65 ans à un instant donné.**
- **B est égal au rapport de l'effectif de nouveaux cas de cancer sur l'effectif de personne temps entre 55 et 65 ans.**
- **C reflète la durée du cancer parmi les salariés âgés de 55 à 65 ans.**
- **D ne peut pas être calculé à partir des données de l'énoncé.**
- **E les propositions A, B, C, D sont fausses.**

QCM 2

- *Le salarié N° 1 contribue pour :*
- **A 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans**
- **B 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans**
- **C 0 personnes-années entre 55 et 65 ans**
- **D 12,1 personnes-années entre 55 et 65 ans**
- **E Les propositions A, B, C, D sont fausses.**

QCM 3

- *Le salarié N° 3 contribue pour :*
- **A 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans**
- **B 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans**
- **C 0 personnes-années entre 55 et 65 ans**
- **D 4,2 personnes-années entre 55 et 65 ans**
- **E Les propositions A, B, C, D sont fausses.**

QCM 4

- *Dans cette entreprise, l'effectif de nouveaux cas de cancer apparus entre 55 et 65 ans :*
- **A est égal à 4**
- **B est égal à 9**
- **C est égal à 16**
- **D ne peut pas être déterminé à partir des données de l'énoncé.**
- **E les propositions A, B, C, D sont fausses.**

QCM 5

- *Dans cette entreprise, l'effectif de personnes-années entre 55 et 65 ans est de 93.5. Le taux d'incidence de cancer entre 55 et 65 ans est égal à :*
- **A 4 nouveaux cas de cancer pour 93.5 personnes-années**
- **B 4 cas de cancer pour 16 salariés**
- **C 9 nouveaux cas de cancer pour 93.5 personnes-années**
- **D 9 nouveaux cas de cancer pour 16 salariés**
- **E les propositions A, B, C, D sont fausses.**

QCM 1- correction

- *Dans cette entreprise, le taux d'incidence de cancer entre 55 et 65 ans :*
- A est égal à la proportion de cas de cancer parmi les salariés de l'entreprise âgés de 55 à 65 ans à un instant donné.
- **B est égal au rapport de l'effectif de nouveaux cas de cancer sur l'effectif de personne temps entre 55 et 65 ans.**
- C reflète la durée du cancer parmi les salariés âgés de 55 à 65 ans.
- D ne peut pas être calculé à partir des données de l'énoncé.
- E les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : B

QCM 1- correction

- *Dans cette entreprise, le taux d'incidence de cancer entre 55 et 65 ans :*
- **A** est égal à la proportion de cas de cancer parmi les salariés de l'entreprise âgés de 55 à 65 ans à un instant donné. **Faux : il s'agit de la prévalence**
- **B** est égal au rapport de l'effectif de nouveaux cas de cancer sur l'effectif de personne temps entre 55 et 65 ans. **Vrai**

$$TI = \frac{m}{PT}$$

- **m = effectif de nouveaux cas apparus entre 55 et 65 ans**
- **PT = effectif de personnes temps susceptibles de produire des nouveaux cas entre 55 et 65 ans**

QCM 1- correction

- *Dans cette entreprise, le taux d'incidence de cancer entre 55 et 65 ans :*
- **C** reflète la durée du cancer parmi les salariés âgés de 55 à 65 ans. **Faux**
(le taux d'incidence reflète la vitesse d'apparition des nouveaux cas de cancer)
- **D** ne peut pas être calculé à partir des données de l'énoncé. **Faux (cf QCM suivants)**

QCM 2 - correction


- ***Le salarié N° 1 contribue pour :***
- A 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans
- **B 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans**
- C 0 personnes-années entre 55 et 65 ans
- D 12,1 personnes-années entre 55 et 65 ans
- E Les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : B

QCM 2 - correction

- *Le salarié N° 1 contribue pour :*
- **A** 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans. **Faux. Il présente un cancer à 57.1 ans**
- **B** 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans. **Vrai**
- **C** 0 personnes-années entre 55 et 65 ans. **Faux. Il est indemne de cancer entre 55 ans et 57,1 ans, soit 2.1 PA**
- **D** 12,1 personnes-années entre 55 et 65 ans. **Faux. Entre 55 et 65 ans, le sujet 1 est suivi 2.1 ans (les 10 années de suivi antérieures à 55 ans ne contribuent pas aux PA comprises entre 55 et 65 ans).**

Personnes-années entre 55 et 65 ans



Personne-années : 93,5

QCM 3 - correction

- ***Le salarié N° 3 contribue pour :***
- **A 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans**
- B 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans
- **C 0 personnes-années entre 55 et 65 ans**
- D 4,2 personnes-années entre 55 et 65 ans
- E Les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : AC

QCM 3 - correction

- *Le salarié N° 3 contribue pour :*
- **A** 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans. **Vrai. Le cancer du salarié N°3 est apparu à 51.2 ans (avant 55 ans)**
- **B** 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans. **Faux**
- **C** 0 personnes-années entre 55 et 65 ans. **Vrai. Ce salarié était déjà atteint d'un cancer au début de l'intervalle 55-65 ans**
- **D** 4,2 personnes-années entre 55 et 65 ans. **Faux**

QCM 4 - correction

- ***Dans cette entreprise, l'effectif de nouveaux cas de cancer apparus entre 55 et 65 ans :***
- **A est égal à 4**
- B est égal à 9
- C est égal à 16
- D ne peut pas être déterminé à partir des données de l'énoncé.
- E les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : A

QCM 4 - correction

- *Dans cette entreprise, l'effectif de nouveaux cas de cancer apparus entre 55 et 65 ans :*
- **A est égal à 4. Vrai. Il s'agit des salariés N° 1, 6, 9, 13**
- **Les autres cas de cancer sont apparus avant 55 ans ou après 65 ans.**

QCM 5

- ***Dans cette entreprise, l'effectif de personnes-années entre 55 et 65 ans est de 93.5. Le taux d'incidence de cancer entre 55 et 65 ans est égal à :***
- **A 4 nouveaux cas de cancer pour 93.5 personnes-années**
- B 4 cas de cancer pour 16 salariés
- C 9 nouveaux cas de cancer pour 93.5 personnes-années
- D 9 nouveaux cas de cancer pour 16 salariés
- E les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : A

QCM 5

- ***Dans cette entreprise, l'effectif de personnes-années entre 55 et 65 ans est de 93.5. Le taux d'incidence de cancer entre 55 et 65 ans est égal à :***
- **A 4 nouveaux cas de cancer pour 93.5 personnes-années.**

Vrai

$$TI = \frac{m}{PA}$$

- **m = effectif de nouveaux cas apparus entre 55 et 65 ans = 4**
- **PA = effectif de personnes années susceptibles de produire des nouveaux cas de cancer entre 55 et 65 ans = 93.5**

Exercice II

- On souhaite comparer la mortalité entre la région Nord Pas-de-Calais et la région Limousin, en 1996, à l'aide des données résumées dans le tableau suivant.

Nord-Pas-de-CalaisLimousinFrance

Age	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)	Population (million)	Taux mortalité (‰)
<35	1688	2.175	0.8	222	0.305	0.7	28.568	0.9
35- 64	9039	1.320	6.8	1345	0.268	5.0	20.137	5.0
≥ 65	25985	0.467	55.7	8156	0.150	54.5	7.871	51.0
total	36712	3.962	9.3	9723	0.723	13.4	56.577	9.3

adapté de Czernichow P, Chaperon J, et Le Coutour X. Epidémiologie. Paris: Masson 2001

QCM 1

- *En 1996, dans la région Nord Pas-de-Calais :*
- **A** le taux spécifique de mortalité pour la classe d'âge 35-64 ans était de 6.8 décès pour 1000 personnes années
- **B** l'effectif observé de décès était de 9039 pour la classe d'âge 35-64 ans
- **C** le taux brut de mortalité était de 9.3 décès pour 1000 personnes années
- **D** la part de la classe d'âge ≥ 65 ans dans la population totale était égale à $0.467 / 3.962$
- **E** les propositions A, B, C, D sont fausses.

QCM 2

- ***On a calculé un taux de mortalité pour la région Nord Pas-de-Calais en 1996 à l'aide de la formule suivante :***

$$\frac{28.568}{56.577} \times 0.8 + \frac{20.137}{56.577} \times 6.8 + \frac{7.871}{56.577} \times 55.7 = 10.6\text{‰}$$

- ***Dans cette expression :***
- **A 10.6 ‰ est le taux standardisé de mortalité annuelle de la région Nord Pas-de-Calais**
- **B on a utilisé la méthode de la standardisation indirecte**
- **C 20.137 / 56.577 est la part de la part de la classe d'âge 35-64 ans dans la population française totale**
- **D la population type utilisée est la population française**
- **E les propositions A, B, C, D sont fausses.**

QCM 3

- ***On a calculé un taux de mortalité pour la région Limousin en 1996 à***
- ***l'aide de la formule suivante :***

$$\frac{28.568}{56.577} \times 0.7 + \frac{20.137}{56.577} \times 5.0 + \frac{7.871}{56.577} \times 54.5 = 9.7 \text{ ‰}$$

- ***En 1996 :***
- **A le taux brut de mortalité dans le Limousin était supérieur au taux brut de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais**
- **B pour chaque classe d'âge, le taux spécifique de mortalité dans le Limousin était inférieur au taux spécifique de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais**
- **C le taux standardisé de mortalité dans le Limousin était supérieur au taux standardisé de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais**

QCM 3 (suite)

- **D la part de la classe d'âge ≥ 65 ans dans la population est plus importante dans le Limousin que dans le Nord Pas de Calais.**
- **E les propositions A, B, C, D sont fausses.**

QCM 4

- ***On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais en 1996 à l'aide de la formule suivante :***

$$(2.175 \times 0.9 + 1.320 \times 5.0 + 0.467 \times 51.0) \times 1000 = 32374$$

- ***Dans cette expression :***
- **A l'effectif observé de la classe d'âge ≥ 65 ans est égal à 0,467 millions dans le Nord Pas-de-Calais**
- **B le taux de mortalité spécifique de la classe d'âge ≥ 65 ans est de 51 décès pour 1000 personnes années en France**
- **C l'effectif attendu de décès dans la région Nord Pas-de-Calais est de 32374**
- **D la population type utilisée est la population française**
- **E les propositions A, B, C, D sont fausses.**

QCM 5

- ***On a calculé un effectif de décès pour la région Limousin en 1996 à l'aide de la formule suivante :***

$$(0.305 \times 0.9 + 0.268 \times 5.0 + 0.150 \times 51.0) \times 1000 = 9264$$

- ***En 1996 :***
- **A l'effectif attendu de décès dans la région Limousin est de 9264**
- **B l'effectif observé de décès dans la région Limousin est de 9723**
- **C le standardized mortality ratio de la région Limousin par rapport à la France est égal à 9723/9264**
- **D le standardized mortality ratio de la région Nord Pas-de-Calais par rapport à la France est supérieur à 1**
- **E les propositions A, B, C, D sont fausses.**

QCM 1- correction

- *En 1996, dans la région Nord Pas-de-Calais :*
- **A** le taux spécifique de mortalité pour la classe d'âge 35-64 ans était de 6.8 décès pour 1000 personnes années
- **B** l'effectif observé de décès était de 9039 pour la classe d'âge 35-64 ans
- **C** le taux brut de mortalité était de 9.3 décès pour 1000 personnes années
- **D** la part de la classe d'âge ≥ 65 ans dans la population totale était égale à $0.467 / 3.962$
- **E** les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : ABCD

QCM 1- correction

A le taux spécifique de mortalité pour la classe d'âge 35-64 ans était de 6.8 décès pour 1000 personnes années. **Vrai**

Nord-Pas-de-Calais			
Age	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)
<35	1688	2.175	0.8
35-64	9039	1.320	6.8
≥ 65	25985	0.467	55.7
total	36712	3.962	9.3

QCM 1- correction

B l'effectif observé de décès était de 9039 pour la classe d'âge 35-64 ans. **Vrai**

Nord-Pas-de-Calais

Age	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)
<35	1688	2.175	0.8
35-64	9039	1.320	6.8
≥ 65	25985	0.467	55.7
total	36712	3.962	9.3

QCM 1- correction

C le taux brut de mortalité était de 9.3 décès pour 1000 personnes années. **Vrai**

Nord-Pas-de-Calais

Age	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)
<35	1688	2.175	0.8
35-64	9039	1.320	6.8
≥ 65	25985	0.467	55.7
total	36712	3.962	9.3

QCM 1- correction

D la part de la classe d'âge ≥ 65 ans dans la population totale était égale à 0.467 / 3.962. **Vrai**

Nord-Pas-de-Calais

Age	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)
<35	1688	2.175	0.8
35-64	9039	1.320	6.8
≥ 65	25985	0.467	55.7
total	36712	3.962	9.3

QCM 2 - correction

- ***On a calculé un taux de mortalité pour la région Nord Pas-de-Calais en 1996 à l'aide de la formule suivante :***

$$\frac{28.568}{56.577} \times 0.8 + \frac{20.137}{56.577} \times 6.8 + \frac{7.871}{56.577} \times 55.7 = 10.6\text{‰}$$

- ***Dans cette expression :***
- **A 10.6 ‰ est le taux standardisé de mortalité annuelle de la région Nord Pas-de-Calais**
- B on a utilisé la méthode de la standardisation indirecte
- **C 20.137 / 56.577 est la part de la part de la classe d'âge 35-64 ans dans la population française totale**
- **D la population type utilisée est la population française**
- E les propositions A, B, C, D sont fausses. **Correction : ACD**

QCM 2 - correction

- ***On a calculé un taux de mortalité pour la région Nord Pas-de-Calais en 1996 à l'aide de la formule suivante :***

$$\frac{28.568}{56.577} \times 0.8 + \frac{20.137}{56.577} \times 6.8 + \frac{7.871}{56.577} \times 55.7 = 10.6\text{‰}$$

$$\text{Taux standardisé} = \sum_{i=1}^n P_i \times T_i$$

P_i = part de la classe d'âge i dans la population de référence (France)

T_i = Taux spécifique de mortalité observé dans la classe d'âge i (Nord Pas-de-Calais)

Méthode de la population type = standardisation directe

QCM 2 - correction

- *Dans cette expression :*
- **A** 10.6 ‰ est le taux standardisé de mortalité annuelle de la région Nord Pas-de-Calais. **Vrai**
- **B** on a utilisé la méthode de la standardisation indirecte. **Faux : il s'agit de la standardisation directe**
- **C** $20.137 / 56.577$ est la part de la classe d'âge 35-64 ans dans la population française totale. **Vrai (cf tableau diapo 22)**
- **D** la population type utilisée est la population française. **Vrai : on applique la part de chaque classe d'âge dans la population française aux taux spécifiques de mortalité observés dans le Nord Pas-de-Calais.**

QCM 3 - correction

- ***On a calculé un taux de mortalité pour la région Limousin en 1996 à l'aide de la formule suivante :***

$$\frac{28.568}{56.577} \times 0.7 + \frac{20.137}{56.577} \times 5.0 + \frac{7.871}{56.577} \times 54.5 = 9.7 \text{ ‰}$$

- ***En 1996 :***
- **A le taux brut de mortalité dans le Limousin était supérieur au taux brut de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais**
- **B pour chaque classe d'âge, le taux spécifique de mortalité dans le Limousin était inférieur au taux spécifique de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais**
- **C le taux standardisé de mortalité dans le Limousin était supérieur au taux standardisé de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais**

QCM 3 – correction (suite)

- **D la part de la classe d'âge ≥ 65 ans dans la population est plus importante dans le Limousin que dans le Nord Pas de Calais.**
- E les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : ABD

QCM 3 - correction

- **En 1996 :**
- **A le taux brut de mortalité dans le Limousin était supérieur au taux brut de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais. **Vrai.****

Age	<u>Nord-Pas-de-Calais</u>			<u>Limousin</u>		
	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)
<35	1688	2.175	0.8	222	0.305	0.7
35-64	9039	1.320	6.8	1345	0.268	5.0
≥ 65	25985	0.467	55.7	8156	0.150	54.5
total	36712	3.962	9.3	9723	0.723	13.4

QCM 3 - correction

- **B** pour chaque classe d'âge, le taux spécifique de mortalité dans le Limousin était inférieur au taux spécifique de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais. **Vrai.**

Age	<u>Nord-Pas-de-Calais</u>			<u>Limousin</u>		
	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)
<35	1688	2.175	0.8	222	0.305	0.7
35-64	9039	1.320	6.8	1345	0.268	5.0
≥ 65	25985	0.467	55.7	8156	0.150	54.5
total	36712	3.962	9.3	9723	0.723	13.4

QCM 3 - correction

- **C le taux standardisé de mortalité dans le Limousin était supérieur au taux standardisé de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais. Faux**

- *Limousin*

$$\frac{28.568}{56.577} \times 0.7 + \frac{20.137}{56.577} \times 5.0 + \frac{7.871}{56.577} \times 54.5 = 9.7\text{‰}$$

- *Nord Pas-de-Calais*

$$\frac{28.568}{56.577} \times 0.8 + \frac{20.137}{56.577} \times 6.8 + \frac{7.871}{56.577} \times 55.7 = 10.6\text{‰}$$

QCM 3 - correction

- D la part de la classe d'âge ≥ 65 ans dans la population est plus importante dans le Limousin que dans le Nord Pas de Calais. **Vrai.**
- **2 moyens de répondre à cette question**

	<u>Nord-Pas-de-Calais</u>			<u>Limousin</u>		
Age	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)
≥ 65	25985	0.467	55.7	8156	0.150	54.5
total	36712	3.962	9.3	9723	0.723	13.4

$0.467 / 3.962 = 11\%$

$0.150 / 0.723 = 20\%$

QCM 3 - correction

- **D la part de la classe d'âge ≥ 65 ans dans la population est plus importante dans le Limousin que dans le Nord Pas de Calais. **Vrai.****
- **Taux standardisé mortalité : Limousin < Nord Pas-de-Calais**
- **Taux spécifiques de mortalité : Limousin < Nord Pas-de-Calais**
- **Taux brut mortalité : Limousin > Nord Pas-de-Calais**
- **→ Age de Population : Limousin > Nord Pas-de-Calais**

QCM 4 – correction

- *On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais en 1996 à l'aide de la formule suivante :*

$$(2.175 \times 0.9 + 1.320 \times 5.0 + 0.467 \times 51.0) \times 1000 = 32374$$

- *Dans cette expression :*
- **A** l'effectif observé de la classe d'âge ≥ 65 ans est égal à 0,467 millions dans le Nord Pas-de-Calais
- **B** le taux de mortalité spécifique de la classe d'âge ≥ 65 ans est de 51 décès pour 1000 personnes années en France
- **C** l'effectif attendu de décès dans la région Nord Pas-de-Calais est de 32374
- **D** la population type utilisée est la population française
- **E** les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : ABC

QCM 4 – correction

- *On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais en 1996 à l'aide de la formule suivante :*

$$(2.175 \times 0.9 + 1.320 \times 5.0 + 0.467 \times 51.0) \times 1000 = 32374$$

$$\text{décès attendus} = \sum_{i=1}^n T_i \times N_i$$

N_i = effectif de la classe d'âge i dans la population observée (Nord Pas-de-Calais)

T_i = Taux spécifique de mortalité dans la classe d'âge i dans la population de référence (France)

Méthode mortalité type = standardisation indirecte

QCM 4 – correction

- *On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais en 1996 à l'aide de la formule suivante :*

$$(2.175 \times 0.9 + 1.320 \times 5.0 + 0.467 \times 51.0) \times 1000 = 32374$$

- *Dans cette expression :*
- **A l'effectif observé de la classe d'âge ≥ 65 ans est égal à 0,467 millions dans le Nord Pas-de-Calais. **Vrai****

Nord-Pas-de-Calais			
Age	décès	Population (million)	Taux mortalité (‰)
≥ 65	25985	0.467	55.7
total	36712	3.962	9.3

QCM 4 – correction

- *On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais en 1996 à l'aide de la formule suivante :*

$$(2.175 \times 0.9 + 1.320 \times 5.0 + 0.467 \times 51.0) \times 1000 = 32374$$

- *Dans cette expression :*
- **B le taux de mortalité spécifique de la classe d'âge ≥ 65 ans est de 51 décès pour 1000 personnes années en France. **Vrai****

Age	Population (million)	Taux mortalité (‰)
<35	28.568	0.9
35-64	20.137	5.0
≥ 65	7.871	51.0
total	56.577	9.3

QCM 4 – correction

- *On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais en 1996 à l'aide de la formule suivante :*

$$(2.175 \times 0.9 + 1.320 \times 5.0 + 0.467 \times 51.0) \times 1000 = 32374$$

- *Dans cette expression :*
- **C** l'effectif attendu de décès dans la région Nord Pas-de-Calais est de 32374. **Vrai**
- **D** la population type utilisée est la population française.
Faux : il s'agit de la méthode de la mortalité type

QCM 5 - correction

- ***On a calculé un effectif de décès pour la région Limousin en 1996 à l'aide de la formule suivante :***

$$(0.305 \times 0.9 + 0.268 \times 5.0 + 0.150 \times 51.0) \times 1000 = 9264$$

- ***En 1996 :***
- **A l'effectif attendu de décès dans la région Limousin est de 9264**
- **B l'effectif observé de décès dans la région Limousin est de 9723**
- **C le standardized mortality ratio de la région Limousin par rapport à la France est égal à 9723/9264**
- **D le standardized mortality ratio de la région Nord Pas-de-Calais par rapport à la France est supérieur à 1**
- **E les propositions A, B, C, D sont fausses.**

Correction : ABCD

QCM 5 - correction

- **Standardisation indirecte (mortalité type)**

$$\text{Standardized Mortality Ratio} = \frac{\text{décès observés}}{\text{décès attendus}}$$

$$\text{décès attendus} = \sum_{i=1}^n T_i \times N_i$$

- **SMR = standardized mortality ratio**
- **N_i = effectif de la classe d'âge i dans la population observée**
- **T_i = Taux spécifique de mortalité dans la classe d'âge i dans la population de référence**

QCM 5 - correction

Nord-Pas-de-Calais

$$\text{Standardized Mortality Ratio} = \frac{36712}{32374} = 1,13$$

Limousin

$$\text{Standardized Mortality Ratio} = \frac{9723}{9264} = 1,05$$

QCM 5 - correction

- *On a calculé un effectif de décès pour la région Limousin en 1996 à l'aide de la formule suivante :*

$$(0.305 \times 0.9 + 0.268 \times 5.0 + 0.150 \times 51.0) \times 1000 = 9264$$

- **En 1996 :**
- **A** l'effectif attendu de décès dans la région Limousin est de 9264.
Vrai
- **B** l'effectif observé de décès dans la région Limousin est de 9723.
Vrai (Cf tableau diapo 22)
- **C** le standardized mortality ratio de la région Limousin par rapport à la France est égal à 9723/9264 . **Vrai (effectif décès observés / effectif décès attendus)**
- **D** le standardized mortality ratio de la région Nord Pas-de-Calais par rapport à la France est supérieur à 1. **Vrai (effectif décès observés > effectif décès attendus → SMR >1)**

Mentions légales

L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et sonores.

Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont strictement réservées à l'université Joseph Fourier de Grenoble.

L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits en 1^{ère} année de Médecine ou de Pharmacie de l'Université Joseph Fourier de Grenoble, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.